

Namuscla (meksiletinhydroklorid)

Varslingskort for pasienter

Leses sammen med pakningsvedlegget

Hvorfor har jeg fått dette kortet?

Namuscla inneholder meksiletin, og noen pasienter som tar meksiletin, kan utvikle hjertearytmi (uregelmessige hjerteslag) som **kan være livstruende**

Hva bør jeg gjøre med dette kortet?

- Dette kortet bør du ha med deg hele tiden. Legg det for eksempel i lommeboken eller vesken.
- Informer lege/sykepleier/apotek om hvilke legemidler du bruker nå, og vis dem dette kortet **før du begynner å bruke nye legemidler** mens du behandles med Namuscla.

Hva er tegn på hjertearytmi?

Vanlige tegn og symptomer på hjertearytmi er:

- følelse av at hjertet slår for hardt eller for raskt (palpitasjoner)
- brystmerter
- uvanlig hodepine
- svetting
- kortpustethet
- svimmelhet, ørhet eller besvimelse

Kontakt legevakt umiddelbart hvis du opplever noen av disse tegnene!

Se kortets bakside

Skriv informasjon om behandling og lege nedenfor:

Startdato for behandling med Namuscla: _____

Pasientens navn: _____

Legens navn: _____

Legens kontaktnummer: _____

Hva annet trenger jeg å vite?

Før du starter behandling med Namuscla og regelmessig under behandlingen, vil du bli testet for å vurdere hjertefunksjonen. Du vil blant annet bli testet med elektrokardiogram (EKG). Avhengig av hjertefunksjonen må du kanskje også testes før og etter at dosen justeres. Følg alle anvisningene fra legen.

Ikke bruk mer enn 3 kapsler Namuscla per dag, og ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Se pakningsvedlegget for Namuscla for mer informasjon, eller kontakt quality@macurepharma.com